



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2025
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - HOSPITAL
PADRE HUMBERTO

PROVA OBJETIVA – GABARITO

ENFERMEIRO

1) Em um adulto jovem, o pulso entre 60 e 100 bpm (batidas por minuto) é considerado:

- a) bradisfigmia
- b) taquisfigmia
- c) taquicardia

d) normocardia

2) De acordo com a Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico, Recuperação Anestésica e Centro de Material e Esterilização – SOBECC (2017), assinale a alternativa que indica o período cirúrgico que compreende as primeiras 24 horas depois da intervenção anestésico cirúrgica.

a) Recuperação pós-anestésica.

b) Pós-operatório imediato.

c) Perioperatório.

d) Pós-operatório mediato.

3) A ferida operatória rompe a integridade da pele e sua função protetora, e a exposição dos tecidos internos aos patógenos no ambiente coloca o paciente em risco de infecção. Sobre a classificação de feridas, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

(1) Ferida limpa. (2) Ferida contaminada. (3) Ferida infectada.

() Inflamação não purulenta; derramamento bruto de conteúdo do trato gastrointestinal, entrada em via biliar ou do trato geniturinário na presença de bile ou urina infectada.

() Eletiva, não traumática, fechada. Não foram atingidos os tratos respiratório, digestivo, genital ou urinário.

() Inflamação purulenta; perfuração pré-operatória dos tratos respiratório, gastrointestinal, biliar ou geniturinário.

a) 3 – 2 – 1

b) 1 – 3 – 2

c) 2 – 1 – 3

d) 1 – 2 – 3.

4) Tendo em vista que o Conselho Federal de Enfermagem publicou recentemente o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem por meio da Resolução COFEN n.º 564/2017, julgue os itens a seguir à luz das prescrições dessa nova norma:

() Nos casos de violência doméstica contra criança, adolescente, idoso ou mulher, o profissional de enfermagem deverá informar os órgãos de responsabilização criminal, mesmo sem autorização do paciente ou de seu representante legal

() É proibido disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente.

() É prerrogativa do profissional de enfermagem recusar-se, mesmo em situação de emergência, a executar prescrição médica na qual não constem assinatura e número de registro profissional do prescritor.

() Devem ser registradas no prontuário do paciente apenas as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma objetiva, cronológica, legível e sem rasuras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) V - V - F - V

b) V - V - V - F

c) V - V - F - F

d) V - F - V - V

5) Para realizar transfusão sanguínea em um paciente, quais os calibres adequados dos cateteres à serem utilizados:

a) 18 e 20

b) 22 e 18

c) 24 e 20

d) 22 e 24

6) Considerando os agentes vasoativos utilizados no tratamento do choque, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

(1) Vasodilatadores (2) Vasoconstritores (3) Simpaticomiméticos.

() Dobutamina e Dopamina. () Nitroglicerina e Nitroprussiato. () Vasopressina e Norepinefrina.

a) 1 – 2 – 3

b) 3 – 2 – 1

c) 3 – 1 - 2

d) 2 – 3 - 1

7) São considerados sinais e sintomas da Diabetes Mellitus:

a) Perda de peso, poliúria, polidipsia, hálito cetônico, glicemia de jejum igual a 90 mg/dl;

b) Glicemia de jejum igual ou maior a 126 mg/dl, polidipsia, poliúria, polifagia, perda de peso inexplicável;

c) Aumento de peso, cefaleia intensa, polaciúria, disúria, glicemia de jejum igual a 200 mg/dl.

d) Polidipsia, polifagia, poliúria e glicemia de jejum igual a 110 mg/dl;

8) Entre as atribuições da comissão de controle de infecção hospitalar, está a redução da disseminação de infecção cruzada. Com relação aos tipos de isolamento e às precauções recomendadas, assinale a alternativa correta.

a) A precaução de contato é indicada para pacientes suspeitos de tuberculose pulmonar e os profissionais, nesses casos, devem utilizar máscara PFF2 (N95) durante o atendimento.

b) A precaução de aerossóis é indicada para pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica, nos casos em que for detectado um microrganismo como, por exemplo, a bactéria *Klebsiella pneumoniae*.

c) A precaução de gotículas é indicada para pacientes suspeitos de patologias como coqueluche, caxumba, rubéola etc.

d) O paciente em precaução de aerossóis deve ser mantido em um quarto isolado, e os profissionais devem utilizar máscara cirúrgica, óculos e avental descartável durante o atendimento.

9) Após uma criança dar entrada com crise asmática e passar pelo médico, uma das medicações veio prescrita da seguinte forma:

“Hidro cortizona 500 mg ----- Diluir para 10 ml de AD e administrar 100 mg agora.”

O técnico de enfermagem veio até você, enfermeiro de plantão, tirar uma dúvida quanto ao cálculo de medicação. Quantos ml da diluição devem ser administrados para atingir a dose necessária:

a) 2 ml

b) 3 ml

c) 4 ml

d) 5 ml

10) Uma criança de 2 anos é admitida no serviço de urgência apresentando sinais de desidratação moderada após episódio de diarreia aguda. A avaliação inicial identifica mucosas secas, olhos fundos e frequência cardíaca elevada. Com base nos protocolos de reidratação, qual a conduta inicial mais indicada pelo enfermeiro?

a) Administrar soro hipertônico por via oral em pequenas doses frequentes.

b) Iniciar a terapia de reidratação oral com solução de reidratação oral ou sonda nasogástrica.

c) Interromper a alimentação com oferta energética alimentação até reestabelecer a hidratação.

d) Oferecer líquidos via oral e administrar antieméticos.

11) A prevenção da lesão por pressão é considerada uma meta do NSP (Núcleo de Segurança do Paciente) e é responsabilidade da equipe multidisciplinar em todos os níveis de atenção à saúde. Sobre esse assunto é incorreto afirmar que:

a) A mudança de decúbito de 2 em duas horas, para pacientes acamados, com mobilidade prejudicada, diminui o risco de desenvolver LPP;

b) A utilização de colchões especiais, como o pneumático e popular casca de ovo, melhoram consideravelmente a diminuição de pontos de pressão na pele;

c) A avaliação de pacientes com possível risco de LPP, não inclui revisão dos fatores nutricionais e de hidratação.

d) Manter a pele seca e hidratada é uma ação preventiva, para evitar LPP

12) Com o objetivo de alertar para a importância do ato de higienizar as mãos, desde 2007 a Organização Mundial de Saúde – OMS – realiza campanhas de sensibilização e conscientização de profissionais de saúde, governantes, administradores hospitalares e população em geral sobre a relevância do procedimento para a promoção da saúde em todo o mundo e instituiu a data de 5 de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A campanha retoma os 5 momentos de higienização das mãos que devem ser seguidos pelos profissionais de saúde. Dentre esses momentos, a opção INCORRETA é:

a) antes e após contato com o paciente.

b) antes da realização de procedimento asséptico.

c) após risco de exposição a fluidos corporais.

d) antes e logo após calçar as luvas.

13) Uma paciente internada na sala de recuperação de um hospital recebe uma prescrição médica de 1.000 mg de Dipirona Endovenosa (EV). Sabendo-se que na unidade está disponível dipirona 500 mg/mL em ampolas de 2 mL, quantas ampolas devem ser administradas para essa paciente?

a) Uma.

b) Duas.

c) Três.

d) Quatro.

14) Para a boa evolução de um atendimento prestado, é necessário que tudo seja descrito e registrado de forma padrão, a fim de se ter uma compreensão universal. Sabendo disso, relacione a Coluna 1 à Coluna 2 a respeito de termos técnicos utilizados na prática da Enfermagem.

Coluna 1

1. Cianose. 2. Deambular. 3. Epistaxe. 4. Disúria.

Coluna 2

() Caminhar, andar.

() Sangramento no nariz.

() Dificuldade de urinar que pode ou não estar acompanhada de dor.

() Coloração azulada na pele.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) 1 – 2 – 3 – 4.

b) 2 – 3 – 4 – 1.

c) 3 – 2 – 4 – 1.

d) 4 – 1 – 3 – 2.

15) Paciente internado na unidade de clínica médica, apresentando quadro inflamatório e infeccioso. Foi prescrito pela equipe médica penicilina cristalina 3800000UI de 6/6 horas. Na unidade dispõe desse medicamento em frasco de 5000000UI. **Utilizando como informação complementar, dilua-se para 10 ml de SF.** Levando em consideração que serão 4 doses ao dia, como você enquanto enfermeiro, orientaria a sua equipe sobre quantos ML o paciente receberá ao todo:

a) 7,6 ml

b) 30,4 ml

c) 28 ml

d) 12,5 ml

16) Na unidade de clínica cirúrgica foi prescrito para o paciente 10 mg de Decadron de 8/8 horas. Na unidade tem frasco de 4 mg/ml de 2,5 ml. Quanto(s) frasco(s) o paciente receberá durante 3 dias?

a) 1 frasco

b) 5 frascos

c) 3 frascos

d) 9 frascos

17) Nitratos são medicamentos que promovem vasodilatação arterial e principalmente venosa, diminuem a pré e pós-carga ventricular, trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio. São utilizados para alívio de dor isquêmica, congestão pulmonar e diminuição pressórica. Logo após o primeiro ECG, nos casos em que houver dor torácica isquêmica, deve ser administrado nitrato (dinitrato de isossorbida 5 mg ou mononitrato de isossorbida 5 mg) por via:

a) Endovenosa

b) Oral

c) Subcutânea

d) Sublingual

18) No frasco de Insulina NPH (100 UI/mL) quantas Unidades Internacionais (UI) correspondem ao volume de 0,4mL?

a) 0,04

b) 4,0

c) 40

d) 0,4

19) Uma criança de 3 anos, em observação na unidade de emergência pediátrica para investigação de quadro respiratório, em uso de máscara de oxigênio, estava estável, com saturação de 98% de O₂.

Subitamente ela se agita, sua frequência respiratória começa a aumentar e sua saturação cai para 84%. Considerando a situação descrita, quais ações devem ser realizadas imediatamente pelo técnico de enfermagem?

I-Verificar se o oxímetro está conectado à criança.

II-Checar a rede de O₂ e as conexões da máscara de oxigênio.

III-Observar o padrão respiratório, a coloração e a reatividade da criança.

IV-Aumentar a oferta de oxigênio por meio de ajuste no fluxômetro.

a) I e IV.

b) I, II e III.

c) II, III e IV.

d) I, II e IV.

20) (Residência/USP/2019) W.L.M., 65 anos, foi levado ao pronto- socorro pela filha, pois está apresentando picos febris de até 38,5°C, de difícil controle, há 3 dias, regurgitação da alimentação e sonolência. Durante triagem no pronto- socorro, você enquanto enfermeira(o) verifica que W.L.M. é diabético e evoluiu com demência após Acidente Vascular Cerebral há 2 anos. Ao realizar o exame físico, aferido temperatura de 37,4°C, frequência respiratória de 25 rpm, frequência cardíaca de 135 bpm, pressão arterial de 85 x 65 mmHg e tempo de enchimento capilar de 4 segundos. **O paciente apresenta- se sonolento e pouco responsivo ao estímulo verbal. Verifica- se a presença de ferida em região sacral com secreção abundante, odor fétido e tecido desvitalizado presente. Você solicita avaliação médica, após a qual W.L.M. é internado.** Após seu adoecimento, não conseguiu mais realizar suas atividades.

a) Com base no histórico de enfermagem e no exame físico levantado por você enquanto enfermeira (o), identifique e justifique um importante diagnóstico de enfermagem relacionado à indicação de internação de W.L.M.

b) Cite e justifique 4 cuidados de enfermagem que o (a) enfermeiro (a) deve prescrever para a melhora da ferida sacral.

Boa Prova!