



PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 2025
MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO ESPÍRITO SANTO - HOSPITAL
PADRE HUMBERTO

PROVA OBJETIVA – GABARITO

TÉCNICO DE ENFERMAGEM

1) Em um adulto jovem, o pulso entre 60 e 100 bpm (batidas por minuto) é considerado:

- a) bradisfigmia
- b) taquisfigmia
- c) taquicardia
- d) normocardia**

2) Analise as afirmativas abaixo sobre as atribuições do técnico de enfermagem na RPA (recuperação pós anestésica), e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

() realizar manutenção da unidade para atendimento aos pacientes, de acordo com as orientações do enfermeiro

() prestar cuidados de enfermagem aos pacientes, conforme prescrição de enfermagem

() realizar com segurança a alta e transferência dos pacientes para enfermaria de origem

() elaborar plano de cuidados, supervisionar sua execução e realizar as atividades complexas de enfermagem, com base na Sistematização da Assistência de Enfermagem Perioperatória (SAEP)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) V - V - V - V

b) V - V - V - F

c) V - V - F - F

d) V - F - V - V

3) A ferida operatória rompe a integridade da pele e sua função protetora, e a exposição dos tecidos internos aos patógenos no ambiente coloca o paciente em risco de infecção. Sobre a classificação de feridas, relacionar as colunas e assinalar a sequência correspondente.

(1) Ferida limpa. (2) Ferida contaminada. (3) Ferida infectada.

() Inflamação não purulenta; derramamento bruto de conteúdo do trato gastrointestinal, entrada em via biliar ou do trato geniturinário na presença de bile ou urina infectada.

() Eletiva, não traumática, fechada. Não foram atingidos os tratos respiratório, digestivo, genital ou urinário.

() Inflamação purulenta; perfuração pré-operatória dos tratos respiratório, gastrointestinal, biliar ou geniturinário.

a) 3 – 2 – 1

b) 1 – 3 – 2

c) 2 – 1 – 3

d) 1 – 2 – 3.

4) Tendo em vista que o Conselho Federal de Enfermagem publicou recentemente o novo Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem por meio da Resolução COFEN n.º 564/2017, julgue os itens a seguir à luz das prescrições dessa nova norma:

() Nos casos de violência doméstica contra criança, adolescente, idoso ou mulher, o profissional de enfermagem deverá informar os órgãos de responsabilização criminal, mesmo sem autorização do paciente ou de seu representante legal

() É proibido disponibilizar o acesso a informações e documentos a terceiros que não estejam diretamente envolvidos na prestação da assistência de saúde ao paciente.

() É prerrogativa do profissional de enfermagem recusar-se, mesmo em situação de emergência, a executar prescrição médica na qual não constem assinatura e número de registro profissional do prescritor.

() Devem ser registradas no prontuário do paciente apenas as informações inerentes e indispensáveis ao processo de cuidar, de forma objetiva, cronológica, legível e sem rasuras.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta:

a) V - V - F - V

b) V - V - V - F

c) V - V - F - F

d) V - F - V - V

5) Para realizar transfusão sanguínea em um paciente, quais os calibres adequados dos cateteres à serem utilizados:

a) 18 e 20

b) 22 e 18

c) 24 e 20

d) 22 e 24

6) Durante os cuidados ao paciente, o técnico de enfermagem, ao desprezar a diurese da bolsa coletora conectada à sonda vesical de demora, observou que a urina do paciente estava turva e com presença de pus. Com base nesse caso hipotético, é correto afirmar que o termo técnico a ser utilizado

a) anúria.

b) poliúria.

c) piúria

d) hematúria

7) Patologia cirúrgica cujos sinais e sintomas mais comuns são cólica biliar, presença de cálculos, dor aguda e contínua, normalmente dor à palpação em hipocôndrio direito, náuseas, vômitos e mal-estar. O trecho se refere à:

a) Apendicite

b) Colelitíase

c) Colestase

d) Nefrolitíase

8) Entre as atribuições da comissão de controle de infecção hospitalar, está a redução da disseminação de infecção cruzada. Com relação aos tipos de isolamento e às precauções recomendadas, assinale a alternativa correta.

a) A precaução de contato é indicada para pacientes suspeitos de tuberculose pulmonar e os profissionais, nesses casos, devem utilizar máscara PFF2 (N95) durante o atendimento.

b) A precaução de aerossóis é indicada para pacientes com pneumonia associada à ventilação mecânica, nos casos em que for detectado um microrganismo como, por exemplo, a bactéria *Klebsiella pneumoniae*.

c) A precaução de gotículas é indicada para pacientes suspeitos de patologias como coqueluche, caxumba, rubéola etc.

d) O paciente em precaução de aerossóis deve ser mantido em um quarto isolado, e os profissionais devem utilizar máscara cirúrgica, óculos e avental descartável durante o atendimento.

9) Após uma criança dar entrada com crise asmática e passar pelo médico, uma das medicações veio prescrita da seguinte forma:

“Hidrocortizona 500 mg ----- Diluir para 10 ml de AD e administrar 100 mg agora.”

Quantos ml da diluição devem ser administrados para atingir a dose necessária:

a) 2 ml

b) 3 ml

c) 4 ml

d) 5 ml

10) É recomendado pela Anvisa que, rotineiramente, o cateter venoso periférico flexível não seja trocado durante um determinado período, exceto quando necessário, a fim de reduzir a taxa de infecção. Considerando essa informação, assinale a alternativa que apresenta o tempo recomendado de permanência do cateter em situação normalizada.

a) 24 horas

b) 36 horas

c) 48 horas

d) 96 horas

11) Um técnico de enfermagem verificou os sinais vitais de uma paciente de sessenta anos de idade, internada por apendicite, e obteve os seguintes resultados: pressão arterial de 170 x 130 mmHg; pulso de 62 bpm; temperatura axilar de 38,2 °C; e respiração de 37 mrm. Com base nesses dados, conclui-se que a paciente está:

a) hipertensa, taquicárdica, normotérmica e eupneica.

b) normotensa, normocárdica, hipertérmica e taquipneica.

c) hipertensa, normocárdica, hipertérmica e taquipneica.

d) hipertensa, normocárdica, hipertérmica e eupneica.

12) Com o objetivo de alertar para a importância do ato de higienizar as mãos, desde 2007 a Organização Mundial de Saúde – OMS – realiza campanhas de sensibilização e conscientização de profissionais de saúde, governantes, administradores hospitalares e população em geral sobre a relevância do procedimento para a promoção da saúde em todo o mundo e instituiu a data de 5 de maio como o Dia Mundial de Higienização das Mãos. A campanha retoma os 5 momentos de higienização das mãos que devem ser seguidos pelos profissionais de saúde. Dentre esses momentos, a opção INCORRETA é:

a) antes e após contato com o paciente.

b) antes da realização de procedimento asséptico.

c) após risco de exposição a fluidos corporais.

d) antes e logo após calçar as luvas.

13) Uma paciente internada na sala de recuperação de um hospital recebe uma prescrição médica de 1.000 mg de Dipirona Endovenosa (EV). Sabendo-se que na unidade está disponível dipirona 500 mg/mL em ampolas de 2 mL, quantas ampolas devem ser administradas para essa paciente?

a) Uma.

b) Duas.

c) Três.

d) Quatro.

14) Para a boa evolução de um atendimento prestado, é necessário que tudo seja descrito e registrado de forma padrão, a fim de se ter uma compreensão universal. Sabendo disso, relacione a Coluna 1 à Coluna 2 a respeito de termos técnicos utilizados na prática da Enfermagem.

Coluna 1

1. Cianose. 2. Deambular. 3. Epistaxe. 4. Disúria.

Coluna 2

() Caminhar, andar.

() Sangramento no nariz.

() Dificuldade de urinar que pode ou não estar acompanhada de dor.

() Coloração azulada na pele.

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a) 1 – 2 – 3 – 4.

b) 2 – 3 – 4 – 1.

c) 3 – 2 – 4 – 1.

d) 4 – 1 – 3 – 2.

15) Paciente internado na unidade de clínica médica, apresentando quadro inflamatório e infeccioso. Foi prescrito pela equipe médica penicilina cristalina 3800000UI de 6/6 horas. Na unidade dispõe desse medicamento em frasco de 5000000UI. **Utilizando como informação complementar, dilua-se para 10 ml de SF.** Levando em consideração que serão 4 doses ao dia, quantos ML o paciente receberá ao todo:

a) 7,6 ml

b) 30,4 ml

c) 28 ml

d) 12,5 ml

16) Na unidade de clínica cirúrgica foi prescrito para o paciente 10 mg de Decadron de 8/8 horas. Na unidade tem frasco de 4 mg/ml de 2,5 ml. Quanto(s) frasco(s) o paciente receberá durante 3 dias?

a) 1 frasco

b) 5 frascos

c) 3 frascos

d) 9 frascos

17) Nitratos são medicamentos que promovem vasodilatação arterial e principalmente venosa, diminuem a pré e pós-carga ventricular, trabalho cardíaco e o consumo de oxigênio. São utilizados para alívio de dor isquêmica, congestão pulmonar e diminuição pressórica. Logo após o primeiro ECG, nos casos em que houver dor torácica isquêmica, deve ser administrado nitrato (dinitrato de isossorbida 5 mg ou mononitrato de isossorbida 5 mg) por via:

a) Endovenosa

b) Oral

c) Subcutânea

d) Sublingual

18) No frasco de Insulina NPH (100 UI/mL) quantas Unidades Internacionais (UI) correspondem ao volume de 0,4mL?

a) 0,04

b) 4,0

c) 40

d) 0,4

19) Uma criança de 3 anos, em observação na unidade de emergência pediátrica para investigação de quadro respiratório, em uso de máscara de oxigênio, estava estável, com saturação de 98% de O₂. Subitamente ela se agita, sua frequência respiratória começa a aumentar e sua saturação cai para 84%. Considerando a situação descrita, quais ações devem ser realizadas imediatamente pelo técnico de enfermagem?

I-Verificar se o oxímetro está conectado à criança.

II-Checar a rede de O₂ e as conexões da máscara de oxigênio.

III-Observar o padrão respiratório, a coloração e a reatividade da criança.

IV-Aumentar a oferta de oxigênio por meio de ajuste no fluxômetro.

a) I e IV.

b) I, II e III.

c) II, III e IV.

d) I, II e IV.

20) Você como técnico de enfermagem, está na clínica médica e recebe um paciente proveniente do PS para internação devido a um quadro pulmonar agudo. Faça uma admissão COMPLETA desse paciente no seu setor. Abaixo encontram-se algumas informações apenas para direcionamento, onde também, pode-se utilizar outras informações que não estejam descritas e que você, como técnico de enfermagem ao receber esse paciente, julgar relevante de ser acrescentado.

- Hipertenso, diabético em uso de medicações (Atenolol, Losartana, glibenclamida)

- Desconhece alergia medicamentosa

- Em uso de O₂ a 3 L/min em cateter.

- Acesso venoso calibre 20 em MS;

- Em uso de SVD devido ao quadro agudo em que chegou. (250 ml de diurese no momento).

Boa Prova!